

POUR EN SAVOIR PLUS,
VOUS TROUVEREZ LA FICHE COMPLÈTE
EN CLIQUANT CI-DESSUS

DOUBLE ADMINISTRATION D'ANTICOAGULANT EN EHPAD



1


MÉDECIN SSR

PRÉVISCAN ÉQUILIBRÉ
= PAS DE DOSEAGE INR

4

IDE EHPAD
AS EHPAD

- ✗ 2 MÉDICAMENTS DISPONIBLES
- ✗ MULTIPLES SUPPORTS
- ✗ TRANSMISSIONS ORALES
- ✗ PAS DE RÉSULTATS D'INR
- ✗ DÉLÉGATION DE TÂCHE



2


MÉDECIN TRAITANT

CHANGEMENT PRÉVISCAN POUR ÉLIQUIS

3

PHARMACIEN D'OFFICINE

ACTUALISATION DU PLAN DE TRAITEMENT



HOSPITALISATION EN URGENCE ET DÉCÈS À 10 JOURS

- ✗ NE MENTIONNE PAS L'ARRÊT DU PRÉVISCAN
- ✗ PRESCRIT SUR LE LOGICIEL DE SON CABINET ET NON CELUI DE L'EHPAD
- ✗ TRANSMISSIONS ORALES

* PDA: PRÉPARATION DES DOSES A' ADMINISTRER